

## Schema volledige inhaalvaccinatie

Jan 2008

### Kinderen van 2.5 jaar- 4jaar

Start-0m	Op 2m	Op 8m
DTPa- polio-Hib-HBV	DTPa- polio-Hib-HBV	DTPa- polio-Hib-HBV
MBR (andere injectieplaats)		
	Meningokokken C (andere injectieplaats)	

DTPa- polio-Hib-HBV= Infanrix hexa

### Kinderen van 5-7j

Hib niet meer nodig

HBV wachten op vaccinatieprogramma 11-13j

Start-op 0m	Op 2m	Op 8m
DTPa- polio	DTPa- polio	DTPa- polio
MBR (andere injectieplaats)		
	Meningokokken C (andere injectieplaats)	

DTPa- polio= Tetravac = Infanrix-IPV

Herhalingen MBR normaal schema op 12j, dT normaal schema op 15j

### Kinderen van 8-12j

Start-op 0m	op2m	Op 4m	Op 8-13m
DTPa- polio	DTPa- polio		DTPa- polio
HBV	HBV	HBV	
		MBR (andere injectieplaats)	
			Meningokokken C (andere injectieplaats)

DTPa- polio= Tetravac = Infanrix-IPV

HBV= Hepatitis B =Hbvax pro : Herkomst uit hoog endemisch land eerst HbsAg bepalen

Herhalingen MBR normaal schema op 12j, dT normaal schema op 15j

### Jongeren van 13-18j

Tetravac enkel tot 12j

1xlige dosis voor Pertussis gewenst indien niet gevaccineerd.

Start-op 0m	op 2m	Op 8-13m
dTpa polio	dT polio	dT polio
MBR (andere injectieplaats)	MBR (andere injectieplaats)	
		Meningokokken C (andere injectieplaats)

**dTpa**= Pertussisvaccin voor >12 jaar is niet gratis beschikbaar. Boostrix is het enige vaccin op de markt dat gebruikt kan worden voor pertussis na 12 jaar (ineens gecombineerd met tetanos en difterie).

**dT-polio**= Revaxis is niet gratis beschikbaar. Gratis kan dit vervangen worden door énTedivax pro adulto én Imovax-polio te combineren.

**MBR** : zelfs indien men één van deze 3 infectieziekten heeft doorgemaakt, is de vaccinatie met een MBR vaccin aangewezen. . Zeker de vaccinatietoestand van vrouwen op vruchtbare leeftijd nagaan (één maand anticonceptie voorzien bij de vaccinatie van een vrouw die zwanger kan worden).

### Volwassenen >18 jaar

MBR éénmalig volstaat

1xlige dosis voor Pertussis gewenst indien niet gevaccineerd.

Start-op 0m	Op 2m	Op 8-13m
dTpa polio	dT polio	dT polio
MBR (andere injectieplaats)		

**dTpa**= Pertussisvaccin voor >12 jaar is niet gratis beschikbaar. Boostrix is het enige vaccin op de markt dat gebruikt kan worden voor pertussis na 12 jaar (ineens gecombineerd met tetanos en difterie).

**dT-polio**= Revaxis is niet gratis beschikbaar. Gratis kan dit vervangen worden door énTedivax pro adulto én Imovax-polio te combineren.

**MBR** : zelfs indien men één van deze 3 infectieziekten heeft doorgemaakt, is de vaccinatie met een MBR vaccin aangewezen. Zeker de vaccinatietoestand van vrouwen op vruchtbare leeftijd nagaan (één maand anticonceptie voorzien bij de vaccinatie van een vrouw die zwanger kan worden).